

HCT-116

人结直肠腺癌细胞

(CellCook cat: CC0506)

- **形态特征:** 上皮细胞样
- **生长特征:** 贴壁
- **种属:** 人源
- **组织来源:** 大肠; 结肠
- **疾病:** 结肠癌

规格及存储

常规出库:

T25培养瓶, 1×10^6 cells

活细胞请及时放置于细胞培养箱
(37°C, 5%CO₂)

冻存株出库:

同批次2管, 1×10^6 cells/管

接收后请及时存储于液氮 (-196°C)

使用范围

本产品仅限于科学研究

- 广州赛库生物技术有限公司
- Guangzhou Cellcook Biotech Co., Ltd
- Tel: 020-89449936
- Email: info@cellcook.com
- www.cellcook.com



赛库公众号



赛库微信小程序

培养条件

RPMI 1640(CellCook cat:CM2017,或同配方) 10%胎牛血清(CellCook cat:CM1002L,或更高级别)

推荐培养试剂

基础培养基:

RPMI 1640(CellCook cat:CM2017,或同配方)

血清:

南美胎牛血清(CellCook cat:CM1002L)

添加剂:

\

[配套完全培养基\(CellCook cat:CC0506M\)](#)

传代比例: 1:4传代 (培养面积比)

传代方式: 消化2-3分钟

换液频率: 每周换液2-3次

倍增时间: 36 hours (PubMed=25984343); 17.1 hours

(PubMed=22628656); 22 hours (PubMed=23546019); 17.4 hours (NCI-DTP); ~25-48 hours (DSMZ); ~21 hours (PBCF).

冻存液配方: RPMI 1640+10%FBS+10%DMSO

难度等级: +

培养要点: 暂无

特征特性: HCT116是1979年Brattain M等从患结肠癌的男性病人中分离建立的3株恶性细胞之一; 产生CEA、角蛋白。在半固体琼脂糖培养基中形成克隆。

HCT116在无胸腺的裸鼠有致瘤性, 形成上皮样的肿瘤。

STR位点信息:

STR Profile	AMEL	CSF1PO	D13S317	D16S539	D5S818	D7S820	TH01	TPOX	vWA
HCT-116	X, Y	7, 10	10, 12	11, 13	10, 11	11, 12	8, 9	8	17, 22