

SU-DHL-8

人B细胞淋巴瘤细胞

(CellCook cat: CC1626)

- **形态特征:** 淋巴母细胞样
- **生长特征:** 悬浮
- **种属:** 人源
- **组织来源:** 淋巴
- **疾病:** 弥漫性大B细胞淋巴瘤(GCB型)

规格及存储

常规出库:

 T25培养瓶, 1×10^6 cells

 活细胞请及时放置于细胞培养箱
 (37°C, 5%CO₂)

冻存株出库:

 同批次2管, 1×10^6 cells/管

接收后请及时存储于液氮 (-196°C)

使用范围

本产品仅限于科学研究

- 广州赛库生物技术有限公司
- Guangzhou Cellcook Biotech Co., Ltd
- Tel: 020-89449936
- Email: info@cellcook.com
- www.cellcook.com



赛库公众号



赛库微信小程序

培养条件

RPMI 1640(改良型)(CellCook cat:CM2006,或同配方) 10%澳洲胎牛血清(CellCook cat:CM1003L)

推荐培养试剂

基础培养基:

RPMI 1640(改良型)(CellCook cat:CM2006,或同配方)

血清:

澳洲胎牛血清(CellCook cat:CM1003L)

添加剂:

\

[配套完全培养基\(CellCook cat:CC1626M\)](#)
传代比例: 维持细胞密度在 1×10^5 - 2.5×10^6 cells/ml

传代方式: 离心收集(1000rpm, 5分钟)

换液频率: 2~3天换液1次

倍增时间: ~48-72 hours (DSMZ)

冻存液配方: 90%澳洲胎牛血清 + 10%DMSO

难度等级: +++

培养要点: 需控制细胞密度

特征特性: ATCC通过PCR证实该细胞系不存在Epstein-Barr病毒DNA序列。该细胞系对Canadida摄入呈阴性。这是一个基于弥漫性组织细胞淋巴瘤分类的空细胞系(缺乏所有已知标记物)。这些细胞对LY294002诱导的凋亡没有反应。

STR位点信息:

STR Profile	AMEL	CSF1PO	D13S317	D16S539	D5S818	D7S820	TH01	TPOX	vWA
SU-DHL-8	X	11,12	11,13	12	11,13	8	6,9	8	15,19