

BT-549

人乳腺导管癌细胞 (CellCook cat: CC0315)

- **形态特征:** 上皮细胞样
- **生长特征:** 贴壁
- **种属:** 人源
- **组织来源:** 乳腺
- **疾病:** 浸润性导管癌

规格及存储

常规出库:

T25培养瓶, 1×10^6 cells

活细胞请及时放置于细胞培养箱
(37°C, 5%CO₂)

冻存株出库:

同批次2管, 1×10^6 cells/管

接收后请及时存储于液氮 (-196°C)

使用范围

本产品仅限于科学研究

- 广州赛库生物技术有限公司
- Guangzhou Cellcook Biotech Co.,Ltd
- Tel:020-89449936
- Email:info@cellcook.com
- www.cellcook.com



赛库公众号



赛库微信小程序

培养条件

RPMI 1640(Gibco cat:11875,或同配方) 10%澳洲胎牛血清(Gibco cat:10099,或更高级别) 添加剂:1ug/ml胰岛素(CellCook cat:CM1007)

推荐培养试剂

基础培养基:

RPMI 1640(CellCook: CM2017或Gibco cat: 11875或同配方)

血清:

澳洲胎牛血清(GIBCO :10099141)

添加剂:

1ug/ml胰岛素(CellCook cat:CM1007)

[配套完全培养基\(CellCook cat:CC0315M\)](#)

传代方法: 1:3传代 (培养面积比)

传代方式: 消化2-3分钟

换液频率: 2~3天换液1次

倍增时间: 3.7 days (PubMed=9671407); 51 hours (PubMed=25984343);
53.9 hours (NCI-DTP)

冻存液配方: RPMI 1640+10%澳洲胎牛血清+1ug/ml胰岛素+10%DMSO

难度等级: ++

培养要点: 建议使用澳洲胎牛血清级别血清培养

特征特性: 该细胞1978年由W.G. Coutinho 和 E.Y. Lasfargues建系, 源自一位72岁患有乳腺导管癌的白人女性, 来源组织包括乳头及浸润导管。该细胞形态包括上皮样细胞及多核巨细胞, 可分泌一种粘性物质。

STR位点信息:

STR Profile	AMEL	CSF1PO	D13S317	D16S539	D5S818	D7S820	TH01	TPOX	VWA
BT-549	X	10,12	11	8	11	9,10	9.3	8	15